

Vascular resistance index and the immediate hemodynamic success of lower limb distal artery revascularization

Relação entre o índice de resistência vascular e o sucesso hemodinâmico de revascularizações distais dos membros inferiores

Rebecca Paes de Andrade Souza Caldas¹, Esdras Marques Lins² , Gabriela de Oliveira Buril¹, Fernanda Appolônio Rocha² , Emmanuelle Tenório Albuquerque Godoi Berenguer de Barros e Silva², Larissa Barbosa de Andrade¹, Camilla Lins da Cunha Cavalcanti¹, Guilherme Barros Alves de Carvalho³

Abstract

Background: Revascularization surgery is used to attempt to restore blood flow to the foot in patients with critical ischemia (CI) caused by peripheral arterial occlusive disease of the lower limbs (LL). Ultrasonography with Doppler (USD) SAH emerged in recent years as a highly valuable method for planning this surgical intervention. **Objectives:** To evaluate the relationship between the resistance index (RI), measured with USD, and immediate hemodynamic success of LL revascularization surgery in patients with CI. **Methods:** The study design was a prospective cohort assessing 46 patients with LL CLI who underwent operations to perform infrapopliteal revascularization by angioplasty or bypass from August 2019 to February 2022. All patients underwent preoperative clinical vascular assessment with USD including measurement of the RI of distal LL arteries, LL arteriography, and measurement of the ankle-brachial index (ABI). All patients had their ABI measured again in the immediate postoperative period. **Results:** Forty-six patients were assessed, 25 (54.3%) of whom were male. Age varied from 32 to 89 years (mean: 67.83). Hemodynamic success was assessed by comparison of preoperative and postoperative ABI, showing that hemodynamic success was achieved in 31 (67.4%) patients after revascularization surgery (ABI increased by 0.15 or more). A positive correlation ($p \leq 0.05$) was observed between the RI of the distal revascularized LL artery and immediate hemodynamic success assessed by ABI (lower RI and hemodynamic success). **Conclusions:** This study observed a positive correlation between the resistance index of the distal artery and immediate hemodynamic success of lower limb revascularizations, as assessed by the ankle-brachial index, so that the lower the RI the greater the hemodynamic success achieved.

Keywords: vascular resistance; Doppler ultrasonography; arteriography; peripheral arterial disease; ankle-brachial index.

Resumo

Contexto: A cirurgia de revascularização é proposta para restaurar o fluxo sanguíneo para o pé nos casos de isquemia crítica (IC) devido a doença arterial obstrutiva periférica dos membros inferiores (MMII). O uso de ultrassonografia com Doppler (USD) vem despontando nos últimos anos como um método de grande valor para o planejamento cirúrgico dessa intervenção.

Objetivos: Avaliar a relação entre o índice de resistência (IR), mensurado por meio de USD, e o sucesso hemodinâmico imediato da cirurgia de revascularização dos MMII em pacientes com IC. **Métodos:** O tipo de estudo empregado foi a coorte prospectiva, na qual foram avaliados 46 pacientes portadores de IC dos MMII submetidos à operação de revascularização infrainguinal por angioplastia ou em ponte de agosto de 2019 a fevereiro de 2022. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação clínica vascular, à USD com medida do IR das artérias distais dos MMII, à arteriografia dos MMII e à aferição do índice tornozelo-braquial (ITB) no período pré-operatório. No pós-operatório imediato, todos os pacientes foram submetidos à nova aferição do ITB. **Resultados:** Entre os 46 pacientes avaliados, 25 (54.3%) eram do sexo masculino. A idade variou de 32 a 89 anos (média de 67.83). Quanto ao sucesso hemodinâmico, avaliado pela comparação do ITB pré e pós-operatório, constatou-se que 31 (67.4%) pacientes apresentaram sucesso hemodinâmico após cirurgia de revascularização (aumento do ITB em 0.15 ou mais). Foi observada correlação positiva ($p \leq 0.05$) entre o IR da artéria distal revascularizada do MMII e o sucesso hemodinâmico imediato avaliado pela aferição do ITB (IR menor e sucesso hemodinâmico). **Conclusões:** Na presente pesquisa foi observada uma correlação positiva entre o índice de resistência arterial distal e o sucesso hemodinâmico nas revascularizações dos membros inferiores, avaliada através do índice tornozelobraquial, de forma que, quanto menor foi o IR, maior o sucesso hemodinâmico obtido.

Palavras-chave: resistência vascular; ultrassonografia Doppler; arteriografia; doença arterial periférica; índice tornozelo-braquial.

How to cite: Caldas RPAS, Lins EM, Buril GO, et al. Vascular resistance index and the immediate hemodynamic success of lower limb distal artery revascularization. J Vasc Bras. 2024;23:e20230119. <https://doi.org/10.1590/1677-5449.202301192>

¹Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Hospital das Clínicas – HC, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, Recife, PE, Brasil.

²Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, PE, Brasil.

³Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, Recife, PE, Brasil.

Financial support: None.

Conflicts of interest: No conflicts of interest declared concerning the publication of this article.

Submitted: September 13, 2023. Accepted: December 11, 2023.

The study was carried out at Serviço de Cirurgia Vascular, Hospital das Clínicas (HC), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), linked to Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Recife, PE, Brazil.

Ethics committee approval: CAAE 12346919.0.0000.8807 (HC/EBSERH-UFPE).

 Copyright© 2024 The authors. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

■ INTRODUCTION

Critical ischemia (CI) of the lower limbs (LL) is the most severe stage of peripheral arterial occlusive disease (PAOD) and is related to high rates of morbidity and mortality. Although invasive, digital subtraction angiography (DSA) is the imaging exam most used to define management of patients who are candidates for LL revascularization surgery. Treatment planning using this examination should be based on a detailed analysis of the anatomy of the distal arterial circulation.¹⁻⁴

In these cases, in addition to assessment with DSA, it is also possible to employ hemodynamic data for decision making. Ultrasonography with Doppler (USD) is a noninvasive tool that is available at the majority of services and can provide information on flow, velocity, and resistance in the distal arterial bed. However, these characteristics are often undervalued in preoperative assessment.^{5,6}

Doppler ultrasound can be used to derive the resistance index (RI) of distal LL arteries. The RI is determined by subtracting the peak systolic velocity (PSV) from the end-diastolic velocity (EDV) and dividing by the PSV. As such, the greater the EDV, the lower the RI, inferring that the distal bed SAH lower resistance.⁷

Since the RI is a ratio, it is not affected by changes resulting from use of different angles to measure velocities with USD. This minimizes differences provoked when examinations are performed by different examiners. The RI is therefore an easily acquired tool that is of great value for studying peripheral resistance of the distal arterial bed.⁷

The status of the distal arterial bed SAH a direct impact on the results of revascularization surgery. However, the impact on the outcomes of this surgery of hemodynamic factors such as distal arterial resistance have been studied little. Arterial resistance can be measured transoperatively; but, in addition to being invasive and labor-intensive, these measurements are not available when the artery to be treated is being chosen. Doppler ultrasound is a useful and accessible option for evaluating the resistance of LL arteries noninvasively during the preoperative period.^{8,9}

In view of these considerations, the objective of this study was to evaluate the relationship between the RI of distal arteries and the immediate hemodynamic success of infrainguinal revascularization surgery in patients with LL CI.

■ METHODS

The study design was a prospective cohort. A total of 46 patients admitted for LL CI from August 2019 to February 2022 were assessed. All underwent

clinical vascular assessment, were examined with USD and DSA, and had their ankle-brachial index (ABI) determined. Clinical vascular assessment included palpation of LL pulses and grading of degree of ischemia according to the Rutherford PAOD classification. Figure 1 presents a diagram illustrating the flow of patients through the study.

Doppler ultrasound was performed using GE brand equipment, models LOGIQ S7, LOGIQ P9, LOGIQ, and portable. Patients were examined in the supine position and RI values were derived for arterial segments distal of sites of stenosis or occlusion, providing flow was detected after optimizing the velocity, gain, and frequency parameters. The RI was calculated by dividing the difference between PSV and EDV by PSV (RI = PSV – EDV/PSV).

Each patient's ABI was measured again after revascularization surgery was complete. The change in ABI was analyzed for each patient and those whose ABI had increased by 0.15 or more were defined as having had successful revascularization surgery from a hemodynamic point of view.⁸

Statistical analysis was performed using SPSS 13.0 for Windows and Excel 2019. All tests were executed with a 95% confidence interval. The RI variable was assessed for normality with the Kolmogorov-Smirnov test. The association between RI and surgical success/failure was analyzed using Student's *t* test. The association between preoperative ABI and surgical success was analyzed with Fisher's exact test. The sample size calculation employed the following Formula 1:

$$n = \left(\frac{Z\alpha/2 \cdot \delta}{E} \right)^2 \quad (1)$$

where $Z\alpha/2$ (the critical value for confidence) is 1.96; δ (standard deviation) is 0.13; and E (standard error) is 0.038 (5% of the mean, where the mean = 0.77).




Figure 1. Patient flow diagram.

This study was approved by the Human Research Ethics Committee at the Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, affiliated to the Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC/EBSERH – UFPE), with Ethics Appraisal Submission Certificate 12346919.0.0000.8807. The study was written up in accordance with the STROBE guidelines.

RESULTS

Twenty-five of the 46 patients assessed were male (54.3%). Age ranged from 32 to 89 years (mean of 67.83 and median of 69 years).

Prevalent risk factors for PAOD observed were systemic arterial hypertension (SAH), in 40 (87.0%) patients, diabetes mellitus (DM), in 38 (82.6%), and smoking (prior or current), in 23 (50.0%). All patients had obstructive atherosclerotic arteriopathy. There were no cases of obstructive arteriopathy secondary to inflammatory disease. Figure 2 illustrates the prevalence of comorbidities in the study patients.

With regard to the degree of lower limb ischemia, 41 (89.1%) patients were classified as Rutherford grade 5 (minor tissue loss). Four patients (8.7%) had major tissue loss, at Rutherford grade 6. One (2.2%) patient had pain at rest, at Rutherford grade 4.

Twenty (43.5%) of the patients assessed underwent open revascularization (bypass), 24 (52.2%) had their limbs revascularized by percutaneous transluminal angioplasty (PTA) and 2 (4.3%) underwent hybrid surgery (open surgery combined with endovascular techniques).

With regard to hemodynamic success, assessed by comparing preoperative and postoperative ABI, it was found that 31 (67.4%) patients had hemodynamically successful revascularization surgery (ABI increased by 0.15 or more) (Table 1).

A positive correlation ($p = 0.004$) was observed between the RI of the distal revascularized lower limb artery and immediate hemodynamic success assessed by ABI (lower RI and hemodynamic success) (Table 2).




Figure 2. Comorbidities in the sample studied. SAH = systemic arterial hypertension; DM = diabetes mellitus; DLP = dyslipidemia; CAD = coronary artery disease; CKD-HD = chronic kidney disease on hemodialysis.

Table 1. Correlation between preoperative ankle-brachial index (ABI) values and surgical success.

Variables	Δ ABI (surgical success)		p^*
	Yes n (%)	No n (%)	
Preoperative ABI			
Incompressible (≥ 1.4)	0 (0.0)	8 (100.0)	< 0.001
Normal (0.8-1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	
Mild (0.6-0.79)	10 (66.7)	5 (33.3)	
Moderate (0.4-0.59)	12 (100.0)	0 (0.0)	
Severe (≤ 0.39)	9 (81.8)	2 (18.2)	

*Fisher's exact test.

Table 2. Correlation between the resistance index (RI) and the hemodynamic success of revascularization surgery.

Variables	Δ ABI (surgical success)		Value de p^*
	Yes Mean \pm SD	No Mean \pm SD	
RI of the distal artery	0.62 \pm 0.22	0.77 \pm 0.13	0.004

*Student's t test. ABI = ankle-brachial index; SD = standard deviation.

■ DISCUSSION

This is the first study to relate the RI of the distal LL artery with the hemodynamic success of LL revascularization surgery. The RI measured using USD proved to be a measure that was easy to obtain and was reproducible, with a direct relationship with the hemodynamic success of the surgical procedure.

The search for means to improve the indications for revascularization surgery in patients with LL CI to achieve better results is a continuous need in vascular surgery. Peripheral resistance is a factor that influences the hemodynamic result achieved and should be considered during surgical planning. This study attempted to assess in conjunction the impact of assessing peripheral resistance with USD on the hemodynamic result of surgery.¹⁰

It is important to point out that the majority of people with LL CI are severe cases, with other associated comorbidities, such as DM, SAH, dyslipidemia, smoking, coronary artery disease, and chronic renal failure. Preoperative cardiological assessment habitually classifies these patients as at high risk of perioperative cardiac complications. Against this background, more optimized indications for surgical procedures, based on preoperative assessment tools, would translate to a higher success rate and, therefore, lower reintervention rates, reducing exposure of the patient to a new risk of cardiovascular events provoked by secondary surgery.¹¹

Although all of the patients studied had LL CI, just 1/4 of the sample had ABI ≤ 0.39 , which is compatible with severe ischemia. On the other hand, almost all of the study subjects had Rutherford grade 5 or 6. Only one case had pain at rest, which is still a severe stage of ischemia. As such, it is observed that not all of the patients exhibited ABI compatible with their severity. This was probably because of a considerable number of patients with falsely high ABI due to incompressibility, albeit partial, of the distal LL arteries. Patients with DM, particularly type 2, have thickening of the tunica media of the arteries. In some cases, this thickening leads to incapacity to compress the vessel because of calcium deposited in the area.^{12,13}

In 2016, Tanno et al. evaluated use of a new measure, the ankle hemodynamic index, which demonstrated better correlation with the degree of ischemia compared to the ABI. This finding shows that hemodynamic information, such as peripheral arterial resistance, should be evaluated in conjunction with the ABI to provide a better preoperative analysis.¹⁴

Measurement of change in ABI was used to evaluate the hemodynamic success of revascularization surgery.

In 2015, Je et al.¹⁵ found that revascularized patients with ABI change ≥ 0.15 exhibited, over the short term, improved symptoms and better daily functional capacity, including longer walking distance.

In turn, Katsuki et al.⁸ and Almasri et al.¹⁶ evaluated the long term outcomes and observed that ABI change ≥ 0.15 was an independent factor related to lower risk of additional revascularizations, limb loss, and mortality. In the present study, immediate hemodynamic success was observed in almost 70% of the study population. This value is within the average for data on patency (1 year after revascularization surgery) described in the literature.

It was observed that patients with lower RI subjected to revascularization of arteries tend to have better immediate hemodynamic results, according to change in ABI. Several studies that have assessed peripheral arterial resistance invasively during the intraoperative period show that lower resistance is related to better surgical success. However, few studies have evaluated ultrasonographic measures of this resistance with the objective of assessing revascularization outcomes.^{17,18}

The value of USD for assessment of the distal LL recipient arteries for by-pass or angioplasty is well-established in the current literature, but, in the majority of cases, only velocity, flow, or anatomic data are considered. Assessment using the RI is simple and easy to reproduce across different examiners, since, as it is a ratio of velocities, there are no significant changes when different Doppler angles are used.¹⁹

Objective and noninvasive determination of resistance to identify which routes lead to better perfusion of the foot is important to predict the best postoperative results. This was demonstrated by Buril,²⁰ in 2022, who compared RI with images of the distal LL arteries obtained using DSA.

The major limitation of this study was the lack of follow-up of the patients for a longer period, which would have made it possible to establish the relationship between RI and the long term results of revascularization surgery, considering that the true success of limb revascularization cannot be measured merely by the ABI and must be monitored in terms of clinical progress, including improvement in pain and perfusion, presence of pulses and healing of ulcers. Therefore, additional studies, with larger sample and longer follow-up should be performed to confirm the benefit of systematic assessment of this index during planning of surgical LL revascularizations.

Another limitation of the study was that it was restricted to a single center. This was done to avoid errors in measuring RI, considering that this method is not yet widespread.

CONCLUSIONS

In the present study, a positive correlation was observed between the RI of the distal artery and the immediate hemodynamic success of LL revascularization surgery, assessed by measurement of the ABI. As such, the lower the RI, the greater the hemodynamic success achieved.

This study presents a new way of assessing the distal lower limb arteries of patients with critical ischemia. Measurement of the resistance index as an adjuvant method can provide information of importance to the choice of which artery should be revascularized. Later studies, which are already ongoing, will be able to provide further data on the role of this index in determination of the success of lower limb revascularization surgery.

REFERENCES

- Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL, et al. 2017 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral arterial diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). *Eur Heart J*. 2018;39(9):763-816. <http://dx.doi.org/10.1093/euroheartj/exh095>. PMID:28886620.
- Conte SM, Vale PR. Peripheral arterial disease. *Heart Lung Circ*. 2018;27(4):427-32. <http://dx.doi.org/10.1016/j.hlc.2017.10.014>. PMID:29150158.
- Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, et al. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). *J Vasc Surg*. 2007;45(Suppl S):S5-67. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2006.12.037>. PMID:17223489.
- Conte MS, Bradbury AW, Kohl P, et al. Global vascular guidelines on the management of chronic limb-threatening ischemia. *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2019;58(15):S1-109.e33. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.05.006>. PMID:31182334.
- Kim ESH, Sharma AM, Scissions R, et al. Interpretation of peripheral arterial and venous Doppler waveforms: a consensus statement from the Society for Vascular Medicine and Society for Vascular Ultrasound. *Vasc Med*. 2020;25(5):484-506. <http://dx.doi.org/10.1177/1358863X20937665>. PMID:32665724.
- Takahashi LA, França GJ, Del Valle CE, Ferreira LRC. Assessment of the pedal arteries with Duplex Scanning. *J Vasc Bras*. 2020;19:e20200068. <http://dx.doi.org/10.1590/1677-5449.200068>. PMID:34211519.
- Arbeille P, Berson M, Achaibou F, Bodard S, Locatelli A. Vascular resistance quantification in high flow resistance areas using the Doppler method. *Ultrasound Med Biol*. 1995;21(3):321-8. [http://dx.doi.org/10.1016/0301-5629\(94\)00129-2](http://dx.doi.org/10.1016/0301-5629(94)00129-2). PMID:7645124.
- Katsuki T, Yamaji K, Tomoi Y, Hiramori S, Soga Y, Ando K. Clinical impact of improvement in the ankle-brachial index after endovascular therapy for peripheral arterial disease. *Heart Vessels*. 2020;35(2):177-86. <http://dx.doi.org/10.1007/s00380-019-01485-z>. PMID:31444562.
- Moussa Pacha H, Mallipeddi VP, Afzal N, et al. Association of ankle-brachial indices with limb revascularization or amputation in patients with peripheral artery disease. *JAMA Netw Open*. 2018;1(8):e185547. <http://dx.doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.5547>. PMID:30646276.
- Jaff MR, White CJ, Hiatt WR, et al. An update on methods for revascularization and expansion of the TASC lesion classification to include below-the-knee arteries: a supplement to the Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). *J Endovasc Ther*. 2015;22(5):663-77. <http://dx.doi.org/10.1177/1526602815592206>. PMID:26239796.
- Baubeta Fridh E, Andersson M, Thuresson M, et al. Amputation rates, mortality, and pre-operative comorbidities in patients revascularized for intermittent claudication or critical limb ischaemia: a population based study. *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2017;54(4):480-6. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.07.005>. PMID:28797662.
- Prenner SB, Chirinos JA. Arterial stiffness in diabetes mellitus. *Atherosclerosis*. 2015;238(2):370-9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2014.12.023>. PMID:25558032.
- Potier L, Abi Khalil C, Mohammedi K, Roussel R. Use and utility of ankle brachial index in patients with diabetes. *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2011;41(1):110-6. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2010.09.020>. PMID:21095144.
- Tanno J, Gatake Y, Kasai T, et al. A novel index using ankle hemodynamic parameters to assess the severity of peripheral arterial disease: a pilot study. *PLoS One*. 2016;11(10):e0164756. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0164756>. PMID:27760183.
- Je HG, Kim BH, Cho KI, Jang JS, Park YH, Spertus J. Correlation between patient-reported symptoms and ankle-brachial index after revascularization for peripheral arterial disease. *Int J Mol Sci*. 2015;16(5):11355-68. <http://dx.doi.org/10.3390/ijms160511355>. PMID:25993299.
- Almasri J, Adusumalli J, Asi N, et al. A systematic review and meta-analysis of revascularization outcomes of infrainguinal chronic limb-threatening ischemia. *J Vasc Surg*. 2018;68(2):624-33. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2018.01.066>. PMID:29804736.
- Morais D Fo, Miranda F, Peres MCJ, Barros N, Buriham E, Salles-Cunha S. Segmental waveform analysis in the diagnosis of peripheral arterial occlusive diseases. *Ann Vasc Surg*. 2004;18(6):714-24. <http://dx.doi.org/10.1007/s10016-004-0086-6>. PMID:15599630.
- Rossi FH, Leão PP, Izukawa NM, Prakasan AK. Classificação angiográfica na revascularização do membro inferior isquêmico: pode a angiografia definir a resistência do leito receptor do enxerto? *J Vasc Bras*. 2009;8(3):207-13. <http://dx.doi.org/10.1590/S1677-54492009000300004>.
- Moneta GL. Tibial artery velocities in the diagnosis and follow-up of peripheral arterial disease. *Semin Vasc Surg*. 2020;33(3-4):65-8. <http://dx.doi.org/10.1053/j.semvascsurg.2020.05.008>. PMID:3308598.
- Buril GO. Comparação entre o índice de resistência e a arteriografia na avaliação pré-operatória da isquemia crítica dos membros inferiores [dissertação]. Recife: Programa de Pós-graduação em Cirurgia, Centro de Ciências Médicas, Universidade Federal de Pernambuco; 2022.

Correspondence

Esdras Marques Lins

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Hospital das Clínicas– HC Av. Professor Moraes Rego, s/n, Bloco A, Terreiro - Cidade Universitária CEP 50670-420 - Recife (PE), Brasil
Tel: +55 (81) 99615-4155
E-mail: esdras.lins@ufpe.br

Author information

RPASC - Cirurgia Vascular resident, Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco, linked to Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC/EBSERH – UFPE).
EML - PhD, associate professor III of Cirurgia, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

GOB - Board certified in Ultrassonografia Vascular, Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

FAR - PhD, adjunct professor III of Cirurgia, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

ETAGBBS - PhD, associate professor II, Medicina Clínica, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

LBA - Ultrassonografia Vascular residente, Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco, linked to Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC/EBSERH – UFPE).

CLCC - Ultrassonografia Vascular residente, Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco, linked to Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC/EBSERH – UFPE).

GBAC - Medical student, Faculdade Pernambucana de Saúde.

Author contributions

Conception and design: EML, GOB

Analysis and interpretation: RPASC, GOB

Data collection: RPASC, LBA, CLCC, GBAC

Writing the article: EML, RPASC

Critical revision of the article: EML, FAR, GOB

Final approval of the article*: EML, ETAGBBS

Statistical analysis: FAR

Overall responsibility: EML, ETAGBBS

*All authors have read and approved of the final version of the article submitted to J Vasc Bras.

Relação entre o índice de resistência vascular e o sucesso hemodinâmico de revascularizações distais dos membros inferiores

Vascular resistance index and the immediate hemodynamic success of lower limb distal artery revascularization

Rebecca Paes de Andrade Souza Caldas¹, Esdras Marques Lins² , Gabriela de Oliveira Buril¹, Fernanda Appolônio Rocha² , Emmanuelle Tenório Albuquerque Godoi Berenguer de Barros e Silva², Larissa Barbosa de Andrade¹, Camilla Lins da Cunha Cavalcanti¹, Guilherme Barros Alves de Carvalho³

Resumo

Contexto: A cirurgia de revascularização é proposta para restaurar o fluxo sanguíneo para o pé nos casos de isquemia crítica (IC) devido a doença arterial obstrutiva periférica dos membros inferiores (MMII). O uso de ultrassonografia com Doppler (USD) vem desempenhando nos últimos anos como um método de grande valor para o planejamento cirúrgico dessa intervenção. **Objetivos:** Avaliar a relação entre o índice de resistência (IR), mensurado por meio de USD, e o sucesso hemodinâmico imediato da cirurgia de revascularização dos MMII em pacientes com IC. **Métodos:** O tipo de estudo empregado foi a coorte prospectiva, na qual foram avaliados 46 pacientes portadores de IC dos MMII submetidos à operação de revascularização infrainguinal por angioplastia ou em ponte de agosto de 2019 a fevereiro de 2022. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação clínica vascular, à USD com medida do IR das artérias distais dos MMII, à arteriografia dos MMII e à aferição do índice tornozelo-braquial (ITB) no período pré-operatório. No pós-operatório imediato, todos os pacientes foram submetidos à nova aferição do ITB. **Resultados:** Entre os 46 pacientes avaliados, 25 (54,3%) eram do sexo masculino. A idade variou de 32 a 89 anos (média de 67,83). Quanto ao sucesso hemodinâmico, avaliado pela comparação do ITB pré e pós-operatório, constatou-se que 31 (67,4%) pacientes apresentaram sucesso hemodinâmico após cirurgia de revascularização (aumento do ITB em 0,15 ou mais). Foi observada correlação positiva ($p \leq 0,05$) entre o IR da artéria distal revascularizada do MMII e o sucesso hemodinâmico imediato avaliado pela aferição do ITB (IR menor e sucesso hemodinâmico). **Conclusões:** Na presente pesquisa foi observada uma correlação positiva entre o índice de resistência arterial distal e o sucesso hemodinâmico nas revascularizações dos membros inferiores, avaliada através do índice tornozelobraquial, de forma que, quanto menor foi o IR, maior o sucesso hemodinâmico obtido.

Palavras-chave: resistência vascular; ultrassonografia Doppler; arteriografia; doença arterial periférica; índice tornozelo-braquial.

Abstract

Background: Revascularization surgery is used to attempt to restore blood flow to the foot in patients with critical ischemia (CI) caused by peripheral arterial occlusive disease of the lower limbs (LL). Ultrasonography with Doppler (USD) emerged in recent years as a highly valuable method for planning this surgical intervention. **Objectives:** To evaluate the relationship between the resistance index (RI), measured with USD, and immediate hemodynamic success of LL revascularization surgery in patients with CI. **Methods:** The study design was a prospective cohort assessing 46 patients with LL CLI who underwent operations to perform infringuinal revascularization by angioplasty or bypass from August 2019 to February 2022. All patients underwent preoperative clinical vascular assessment with USD including measurement of the RI of distal LL arteries, LL arteriography, and measurement of the ankle-brachial index (ABI). All patients had their ABI measured again in the immediate postoperative period. **Results:** Forty-six patients were assessed, 25 (54.3%) of whom were male. Age varied from 32 to 89 years (mean: 67.83). Hemodynamic success was assessed by comparison of preoperative and postoperative ABI, showing that hemodynamic success was achieved in 31 (67.4%) patients after revascularization surgery (ABI increased by 0.15 or more). A positive correlation ($p \leq 0.05$) was observed between the RI of the distal revascularized LL artery and immediate hemodynamic success assessed by ABI (lower RI and hemodynamic success). **Conclusions:** This study observed a positive correlation between the resistance index of the distal artery and immediate hemodynamic success of lower limb revascularizations, as assessed by the ankle-brachial index, so that the lower the RI the greater the hemodynamic success achieved.

Keywords: vascular resistance; Doppler ultrasonography; arteriography; peripheral arterial disease; ankle-brachial index.

Como citar: Caldas RPAS, Lins EM, Buril GO, et al. Relação entre o índice de resistência vascular e o sucesso hemodinâmico de revascularizações distais dos membros inferiores. J Vasc Bras. 2024;23:e20230119. <https://doi.org/10.1590/1677-5449.202301191>

¹Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Hospital das Clínicas – HC, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, Recife, PE, Brasil.

²Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, PE, Brasil.

³Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, Recife, PE, Brasil.

Fonte de financiamento: Nenhuma.

Conflito de interesse: Os autores declararam não haver conflitos de interesse que precisam ser informados.

Submetido em: Setembro 13, 2023. Aceito em: Dezembro 11, 2023.

O estudo foi realizado no Serviço de Cirurgia Vascular, Hospital das Clínicas (HC), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Recife, PE, Brasil.

Aprovação do comitê de ética: HC/EBSERH - UFPE, sob o registro CAAE: 12346919.0.0000.8807.

 Copyright© 2024 Os autores. Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.

■ INTRODUÇÃO

A isquemia crítica (IC) dos membros inferiores (MMII) é o estágio mais grave da doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) e está relacionada à morbidade e mortalidade altas. A arteriografia por subtração digital (ASD), embora invasiva, é o exame de imagem mais utilizado na definição da conduta em pacientes candidatos à cirurgia de revascularização do MMII. O planejamento terapêutico com esse exame deve ser baseado em uma análise detalhada da anatomia da circulação arterial distal¹⁻⁴.

Neste cenário, além da avaliação com a ASD, é possível também utilizar dados hemodinâmicos para a tomada de decisão. A ultrassonografia com Doppler (USD) é uma ferramenta não invasiva e que está disponível na maioria dos serviços, podendo fornecer informações de fluxo, velocidade e resistência do leito arterial distal. Porém, tais características são frequentemente subvalorizadas na avaliação pré-operatória^{5,6}.

Por meio da USD, pode ser obtido o índice de resistência (IR) das artérias distais dos MMII. Ele é determinado pelo resultado da subtração da velocidade de pico sistólico (VPS) da velocidade diastólica final (VDF) dividida pela VPS. Dessa forma, quanto maior a VDF, menor é o índice, inferindo menor resistência do leito distal⁷.

Por se tratar de uma razão de valores, o IR não sofre as alterações provocadas pela utilização de diferentes ângulos na obtenção das velocidades na USD. Desta forma, minimizam-se as diferenças obtidas quando os exames são realizados por diferentes examinadores. Assim, o IR torna-se uma ferramenta de fácil obtenção e de grande valor para o estudo da resistência periférica do leito arterial distal⁷.

A situação do leito arterial distal influencia diretamente nos resultados da cirurgia de revascularização. No entanto, os impactos de fatores hemodinâmicos no desfecho desta cirurgia, como a resistência arterial distal, ainda são pouco estudados. As medidas de resistência arterial podem ser obtidas no transoperatório; porém, além de invasivas e laboriosas, não são aferidas antes da escolha da artéria a ser abordada. A USD é uma alternativa útil e acessível para avaliar a resistência em artérias dos MMII de forma não invasiva no pré-operatório^{8,9}.

A partir dessas considerações, o objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre o IR das artérias distais e o sucesso hemodinâmico imediato de cirurgias de revascularização infrainguinal em pacientes com IC dos MMII.

■ MÉTODOS

O modelo de estudo empregado foi a coorte prospectiva. Foram avaliados 46 pacientes internados

com IC dos MMII no período de agosto de 2019 a fevereiro de 2022. Todos foram submetidos à avaliação clínica vascular, à USD, à ASD e à aferição do índice tornozelo-braquial (ITB). A avaliação clínica vascular envolveu a palpação de pulsos dos MMII e a caracterização do grau de isquemia através da classificação de Rutherford para DAOP. A Figura 1 mostra o fluxograma dos pacientes do estudo.

A USD foi realizada em equipamentos da marca GE, nos modelos LOGIQ S7, LOGIQ P9 e LOGIQ E portátil. Os pacientes foram avaliados em decúbito dorsal, e foram obtidos os valores de IR nas artérias em segmentos distais aos locais de estenose ou oclusão, desde que houvesse fluxo identificado após otimizados os parâmetros de velocidade, ganho e frequência. O IR foi calculado através da fórmula obtida pela divisão da diferença da VPS e da VDF pela VPS ($IR = VPS - VDF/VPS$).

Após a realização de cirurgia de revascularização, o ITB foi novamente aferido. A variação do ITB foi analisada em cada indivíduo, e aqueles que obtiveram um aumento igual ou maior que 0,15 foram considerados como tendo apresentado sucesso da cirurgia de revascularização do ponto de vista hemodinâmico⁸.

Para análise estatística, foram utilizados os softwares SPSS 13.0 para Windows e o Excel 2019. Todos os testes foram aplicados com intervalo de confiança de 95%. A variável IR foi avaliada pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. A associação do IR com o sucesso ou insucesso cirúrgico foi realizada através do teste *t* de Student. A associação entre o ITB pré-operatório e o sucesso cirúrgico foi realizada através do teste exato de Fisher. O cálculo do tamanho da amostra foi feito utilizando a seguinte Fórmula 1:

$$n = \left(\frac{Z\alpha / 2 \cdot \delta}{E} \right)^2 \quad (1)$$

em que $Z\alpha/2$ (o valor crítico para o grau de confiança) é 1,96; δ (desvio-padrão) é 0,13; e E (erro-padrão) é 0,038 (5% da média, sendo a média = 0,77).




Figura 1. Fluxograma de pacientes.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC/EBSERH – UFPE), sob o registro do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética 12346919.0.0000.8807. A redação do artigo seguiu a diretriz STROBE.

■ RESULTADOS

Entre os 46 pacientes avaliados, 25 eram do sexo masculino (54,3%). A idade variou de 32 a 89 anos (média de 67,83 anos e mediana de 69).

Em relação aos fatores de risco para DAOP, foram observados como prevalentes a hipertensão arterial sistêmica (HAS), presente em 40 (87,0%) pacientes, o diabetes melito (DM), em 38 (82,6%), e o tabagismo (pregresso ou ativo), em 23 (50,0%). Todos os pacientes apresentavam arteriopatia obstrutiva aterosclerótica. Não houve casos de arteriopatia obstrutiva por doença inflamatória. Na Figura 2, é apresentada a prevalência das comorbidades no grupo de pacientes do estudo.

Quanto ao grau de isquemia do membro inferior, 41 (89,1%) pacientes foram classificados como tendo grau 5 de Rutherford (lesão tecidual menor). Quatro pacientes (8,7%) apresentavam lesão tecidual maior, com grau 6 de Rutherford. Um (2,2%) paciente apresentava dor em repouso, com grau 4 de Rutherford.

Entre os pacientes avaliados, 20 (43,5%) foram submetidos à revascularização aberta (ponte), 24 (52,2%) tiveram o membro revascularizado através de angioplastia transluminal percutânea (ATP) e 2 (4,3%) foram submetidos a cirurgia híbrida (técnica aberta associada à endovascular).

Quanto ao sucesso hemodinâmico, avaliado através da comparação do ITB pré e pós-operatório, foi constatado que 31 (67,4%) pacientes apresentaram sucesso hemodinâmico da cirurgia de revascularização (aumento do ITB em 0,15 ou mais) (Tabela 1).

Foi observada uma correlação positiva ($p = 0,004$) entre o IR da artéria distal revascularizada do membro inferior e o sucesso hemodinâmico imediato avaliado pela aferição do ITB (IR menor e sucesso hemodinâmico) (Tabela 2).




Figura 2. Comorbidades na amostra estudada. HAS = hipertensão arterial sistêmica; DM = diabetes melito; DLP = dislipidemia; DAC = doença arterial coronariana; DRC-HD = doença renal crônica em hemodiálise.

Tabela 1. Correlação entre valores do índice tornozelo-braquial (ITB) no pré-operatório e o sucesso cirúrgico.

Variáveis	Δ ITB (sucesso cirúrgico)		Valor de p*
	Sim n (%)	Não n (%)	
ITB pré-operatório			
Incompressível ($\geq 1,4$)	0 (0,0)	8 (100,0)	< 0,001
Normal (0,8-1,4)	0 (0,0)	0 (0,0)	
Leve (0,6-0,79)	10 (66,7)	5 (33,3)	
Moderado (0,4-0,59)	12 (100,0)	0 (0,0)	
Grave ($\leq 0,39$)	9 (81,8)	2 (18,2)	

*Teste exato de Fisher.

Tabela 2. Correlação entre o índice de resistência (IR) e o sucesso hemodinâmico da cirurgia de revascularização.

Variáveis	Δ ITB (sucesso cirúrgico)		Valor de p*
	Média ± DP	Média ± DP	
IR da artéria distal	0,62±0,22	0,77±0,13	0,004

*Teste t de Student. ITB = índice tornozelo-braquial; DP = desvio-padrão.

■ DISCUSSÃO

Este foi o primeiro estudo a relacionar o IR da artéria distal dos MMII com o sucesso hemodinâmico de uma cirurgia de revascularização dos MMII. O IR aferido através da USD apresentou-se como uma medida de fácil obtenção e reproduzibilidade, tendo relação direta com o sucesso hemodinâmico do procedimento cirúrgico.

Buscar formas de aperfeiçoar a indicação de cirurgias de revascularização em pacientes com IC dos MMII para obter melhores resultados é uma necessidade contínua na área de cirurgia vascular. A resistência periférica é um fator que influencia no resultado hemodinâmico obtido e deve ser considerada durante o planejamento cirúrgico. Este estudo buscou avaliar de forma conjunta o impacto da avaliação da resistência periférica através da USD no resultado hemodinâmico dessas cirurgias¹⁰.

É importante salientar que os pacientes portadores de IC dos MMII são, em sua maioria, pacientes graves, com outras comorbidades associadas, como DM, HAS, dislipidemia, tabagismo, doença arterial coronariana e insuficiência renal crônica. A avaliação cardiológica pré-operatória habitualmente classifica esses pacientes como tendo alto risco para complicações cardíacas perioperatórias. Diante desse contexto, a indicação mais otimizada de procedimentos operatórios, por meio do uso de ferramentas de avaliação no pré-operatório, implicaria em um maior índice de sucesso e, portanto, em menores taxas de reintervenção, reduzindo a exposição do paciente a novo risco de eventos cardiovasculares derivados de cirurgias secundárias¹¹.

Apesar de todos os pacientes estudados serem portadores de IC dos MMII, apenas 1/4 da amostra apresentou ITB ≤ 0,39, sendo compatível com isquemia grave. Por outro lado, quase todos os indivíduos estudados avaliados apresentaram classificação de Rutherford 5 ou 6. Apenas um caso apresentou dor em repouso, sendo também considerado um estágio grave de isquemia. Assim, observa-se que nem todos os pacientes apresentaram ITB compatível com a gravidade. Isso provavelmente está relacionado a um número relevante de pacientes com ITB falsamente elevado, devido a incompressibilidade, ainda que parcial, das artérias distais dos MMII. Os pacientes portadores de DM, sobretudo tipo 2, apresentam espessamento da camada média das artérias. Em alguns casos, esse espessamento acarreta a incapacidade de comprimir o vaso devido ao depósito de cálcio na região^{12,13}.

Tanno et al.¹⁴, em 2016, avaliaram a utilização de uma nova medida, o índice hemodinâmico do tornozelo, que, comparado ao ITB, demonstrou melhor correlação com o grau de isquemia. Esse achado demonstra que informações hemodinâmicas, como resistência arterial periférica, devem ser avaliadas junto com o ITB para uma melhor análise pré-operatória.

Através da mensuração da variação do ITB, foi avaliado o sucesso hemodinâmico imediato da cirurgia de revascularização. Em 2015, Je et al.¹⁵ identificaram que pacientes revascularizados com variação de ITB ≥ 0,15 apresentaram, em curto prazo, melhora dos sintomas e maior capacidade funcional em seu dia a dia, incluindo maior distância caminhada.

Katsuki et al.⁸ e Almasri et al.¹⁶, por sua vez, avaliaram o desfecho a longo prazo e observaram que a variação de ITB ≥ 0,15 é um fator independente relacionado a menor risco de novas revascularizações, perda do membro e mortalidade. No presente estudo, o sucesso hemodinâmico imediato foi observado em quase 70% da população estudada. O valor encontrado está dentro da média dos dados de perviedade (após 1 ano da cirurgia de revascularização) descritos na literatura.

Foi observado que pacientes submetidos à revascularização de artérias com IR mais baixo tendem a apresentar melhor resultado hemodinâmico imediato, de acordo com a variação do ITB. Diversos estudos que avaliaram a resistência arterial periférica de forma invasiva no intraoperatório mostraram que uma menor resistência está relacionada a um melhor sucesso cirúrgico. Porém, poucos trabalhos avaliam medidas ultrassonográficas dessa resistência com a finalidade de avaliar o desfecho da revascularização^{17,18}.

O valor da USD para avaliação das artérias distais dos MMII receptoras de um *by-pass* ou de uma angioplastia é bem estabelecido na literatura atual, mas, na maioria das vezes, são considerados apenas os valores de velocidade, fluxo ou dados anatômicos. A avaliação realizada através do IR é simples e de fácil reproduzibilidade entre examinadores distintos, uma vez que, por tratar-se de um índice de velocidades, não há alterações significativas quando utilizados ângulos diferentes no Doppler¹⁹.

A determinação objetiva e não invasiva da resistência para identificar quais caminhos levam a uma melhor perfusão do pé é importante para predizer um melhor resultado no pós-operatório. Isso foi demonstrado por Buril²⁰, em 2022, ao compararem o IR com as imagens das artérias distais dos MMII obtidas através da ASD.

A principal limitação da atual pesquisa foi a falta de acompanhamento dos pacientes por um período maior, possibilitando estabelecer a relação entre o IR e o resultado da cirurgia de revascularização a longo prazo, considerando que o real êxito de uma revascularização de membro não pode ser aferida apenas com uma medida do ITB, devendo ser acompanhada pela evolução clínica, como melhora da dor e da perfusão, presença de pulsos e cicatrização das lesões. Por isso, mais estudos, com maior amostra e seguimento durante maior tempo, podem ser realizados para que se reforce o benefício da avaliação sistemática desse índice no planejamento cirúrgico das revascularizações de MMII.

Outra limitação da pesquisa foi a sua realização em único centro médico. Isso ocorreu para evitar erros na aferição do IR, considerando que o uso desse método ainda não está estabelecido.

CONCLUSÃO

No presente estudo, foi observada correlação positiva entre o IR da artéria distal e o sucesso hemodinâmico imediato da cirurgia de revascularização do MMII, avaliado pela aferição do ITB. Dessa forma, quanto menor foi o IR, maior foi o sucesso hemodinâmico obtido.

Esta pesquisa apresenta uma nova forma de avaliar as artérias distais dos MMII. A aferição do índice de resistência como método coadjuvante pode fornecer informações importantes na escolha da artéria que será revascularizada. Estudos posteriores, já em andamento, poderão fornecer mais dados sobre o papel desse índice na determinação do sucesso da cirurgia de revascularização dos membros inferiores em pacientes com isquemia crítica.

REFERÊNCIAS

- Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MLEL, et al. 2017 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral arterial diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). *Eur Heart J*. 2018;39(9):763-816. <http://dx.doi.org/10.1093/euroheartj/exh095>. PMid:28886620.
- Conte SM, Vale PR. Peripheral arterial disease. *Heart Lung Circ*. 2018;27(4):427-32. <http://dx.doi.org/10.1016/j.hlc.2017.10.014>. PMid:29150158.
- Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, et al. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). *J Vasc Surg*. 2007;45(Suppl S):S5-67. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2006.12.037>. PMid:17223489.
- Conte MS, Bradbury AW, Kolb P, et al. Global vascular guidelines on the management of chronic limb-threatening ischemia. *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2019;58(1S):S1-109.e33. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2019.05.006>. PMid:31182334.
- Kim ESH, Sharma AM, Scissons R, et al. Interpretation of peripheral arterial and venous Doppler waveforms: a consensus statement from the Society for Vascular Medicine and Society for Vascular Ultrasound. *Vasc Med*. 2020;25(5):484-506. <http://dx.doi.org/10.1177/1358863X20937665>. PMid:32667274.
- Takahashi LA, França GJ, Del Valle CE, Ferreira LRC. Assessment of the pedal arteries with Duplex Scanning. *J Vasc Bras*. 2020;19:e20200068. <http://dx.doi.org/10.1590/1677-5449.200068>. PMid:34211519.
- Arbeille P, Berson M, Achaibou F, Bodard S, Locatelli A. Vascular resistance quantification in high flow resistance areas using the Doppler method. *Ultrasound Med Biol*. 1995;21(3):321-8. [http://dx.doi.org/10.1016/0301-5629\(94\)00129-2](http://dx.doi.org/10.1016/0301-5629(94)00129-2). PMid:7645124.
- Katsuki T, Yamaji K, Tomoi Y, Hiramori S, Soga Y, Ando K. Clinical impact of improvement in the ankle-brachial index after endovascular therapy for peripheral arterial disease. *Heart Vessels*. 2020;35(2):177-86. <http://dx.doi.org/10.1007/s00380-019-01485-z>. PMid:31444562.
- Moussa Pacha H, Mallipeddi VP, Afzal N, et al. Association of ankle-brachial indices with limb revascularization or amputation in patients with peripheral artery disease. *JAMA Netw Open*. 2018;1(8):e185547. <http://dx.doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2018.5547>. PMid:30646276.
- Jaff MR, White CJ, Hiatt WR, et al. An update on methods for revascularization and expansion of the TASC lesion classification to include below-the-knee arteries: a supplement to the Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). *J Endovasc Ther*. 2015;22(5):663-77. <http://dx.doi.org/10.1177/1526602815592206>. PMid:26239796.
- Baubeta Fridh E, Andersson M, Thuresson M, et al. Amputation rates, mortality, and pre-operative comorbidities in patients revascularized for intermittent claudication or critical limb ischaemia: a population based study. *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2017;54(4):480-6. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2017.07.005>. PMid:28797662.
- Prenner SB, Chirinos JA. Arterial stiffness in diabetes mellitus. *Atherosclerosis*. 2015;238(2):370-9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2014.12.023>. PMid:25558032.
- Potier L, Abi Khalil C, Mohammedi K, Roussel R. Use and utility of ankle brachial index in patients with diabetes. *Eur J Vasc Endovasc Surg*. 2011;41(1):110-6. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejvs.2010.09.020>. PMid:21095144.
- Tanno J, Gatake Y, Kasai T, et al. A novel index using ankle hemodynamic parameters to assess the severity of peripheral arterial disease: a pilot study. *PLoS One*. 2016;11(10):e0164756. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0164756>. PMid:27760183.
- Je HG, Kim BH, Cho Kl, Jang JS, Park YH, Spertus J. Correlation between patient-reported symptoms and ankle-brachial index after revascularization for peripheral arterial disease. *Int J Mol Sci*. 2015;16(5):11355-68. <http://dx.doi.org/10.3390/ijms160511355>. PMid:25993299.
- Almasri J, Adusumalli J, Asi N, et al. Asystematic review and meta-analysis of revascularization outcomes of infrainguinal chronic limb-threatening ischemia. *J Vasc Surg*. 2018;68(2):624-33. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jvs.2018.01.066>. PMid:29804736.
- Morais D Fo, Miranda F, Peres MCJ, Barros N, Buriham E, Salles-Cunha S. Segmental waveform analysis in the diagnosis of peripheral arterial occlusive diseases. *Ann Vasc Surg*. 2004;18(6):714-24. <http://dx.doi.org/10.1007/s10016-004-0086-6>. PMid:15599630.
- Rossi FH, Leão PP, Izukawa NM, Prakasan AK. Classificação angiográfica na revascularização do membro inferior isquêmico: pode a angiografia definir a resistência do leito receptor do enxerto? *J Vasc Bras*. 2009;8(3):207-13. <http://dx.doi.org/10.1590/S1677-54492009000300004>.
- Moneta GL. Tibial artery velocities in the diagnosis and follow-up of peripheral arterial disease. *Semin Vasc Surg*. 2020;33(3-4):65-8. <http://dx.doi.org/10.1053/j.semvasc surg.2020.05.008>. PMid:33308598.
- Buril CO. Comparação entre o índice de resistência e a arteriografia na avaliação pré-operatória da isquemia crítica dos membros inferiores [dissertação]. Recife: Programa de Pós-graduação em Cirurgia, Centro de Ciências Médicas, Universidade Federal de Pernambuco; 2022.

Correspondência

Esdras Marques Lins

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Hospital das Clínicas – HC Av. Professor Moraes Rego, s/n, Bloco A, Térreo - Cidade Universitária CEP 50670-420 - Recife (PE), Brasil
Tel.: (81) 99615-4155
E-mail: esdras.lins@ufpe.br

Informações sobre os autores

RPASC - Residente médica em Cirurgia Vascular pelo Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC/EBSERH – UFPE).
EML - Professor doutor associado III de Cirurgia, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
GOB - Especialista em Ultrassonografia Vascular, Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

FAR - Professora doutora adjunta III de Cirurgia, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

ETAGBBS - Professora doutora associada II de Medicina Clínica, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

LBA - Residente médica de Ultrassonografia Vascular, Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC/EBSERH – UFPE).

CLCC - Residente médica de Ultrassonografia Vascular, Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (HC/EBSERH – UFPE).

GBAC - Estudante de Medicina, Faculdade Pernambucana de Saúde.

Contribuições dos autores

Concepção e desenho do estudo: EML, GOB

Análise e interpretação dos dados: RPASC, GOB

Coleta de dados: RPASC, LBA, CLCC, GBAC

Redação do artigo: EML, RPASC

Revisão crítica do texto: EML, FAR, GOB

Aprovação final do artigo*: EML, ETAGBBS

ANÁLISE ESTATÍSTICA: FAR

Responsabilidade geral pelo estudo: EML, ETAGBBS

*Todos os autores leram e aprovaram a versão final submetida ao J Vasc Bras.