

Supplemental Table 1. Treatment-emergent AEs (safety population)

AE	400 mg QD	400 mg QD FED	200 mg BID	600 mg QD	300 mg BID	900 mg QD	1200 mg QD	Total
n (%)	(N=7)	(N=5)	(N=3)	(N=4)	(N=7)	(N=3)	(N=16)	(N=45)
Treatment-emergent AEs of all grades reported in ≥20% of patients								
Rash [‡]	4 (57)	0 (0)	1 (33)	2 (50)	5 (71)	1 (33)	10 (62)	23 (51)
Diarrhea	4 (57)	1 (20)	2 (67)	2 (50)	1 (14)	1 (33)	9 (56)	20 (44)
Anorexia	2 (29)	1 (20)	1 (33)	0 (0)	4 (57)	2 (67)	6 (38)	16 (36)
Fatigue	1 (14)	2 (40)	1 (33)	0 (0)	2 (29)	2 (67)	7 (44)	15 (33)
Anemia	2 (29)	1 (20)	2 (67)	1 (25)	2 (29)	2 (67)	3 (19)	13 (29)
Prolonged ECG QT	0 (0)	1 (20)	3 (100)	0 (0)	2 (29)	2 (67)	4 (25)	12 (27)
Pyrexia	1 (14)	0 (0)	0 (0)	1 (25)	2 (29)	0 (0)	7 (44)	11 (24)
Increased ALT	1 (14)	1 (20)	1 (33)	1 (25)	1 (14)	0 (0)	5 (31)	10 (22)
Dyspnea	1 (14)	2 (40)	0 (0)	1 (25)	2 (29)	0 (0)	4 (25)	10 (22)
Dry skin	2 (29)	0 (0)	1 (33)	2 (50)	0 (0)	1 (33)	4 (25)	10 (22)
Peripheral	1 (14)	1 (20)	0 (0)	1 (25)	1 (14)	0 (0)	6 (38)	10 (22)
Nausea	0 (0)	1 (20)	0 (0)	1 (25)	1 (14)	1 (33)	5 (31)	9 (20)
Constipation	0 (0)	1 (20)	1 (33)	1 (25)	4 (57)	0 (0)	2 (12)	9 (20)
Grade 3 treatment-emergent AEs reported in ≥5% of patients^{‡‡}								
Prolonged ECG QT	0 (0)	1 (20)	2 (67)	0 (0)	2 (29)	2 (67)	2 (12)	9 (20)
Anemia	2 (29)	0 (0)	2 (67)	0 (0)	1 (14)	1 (33)	1 (6)	7 (16)
Rash ^{‡‡}	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (29)	1 (33)	2 (12)	5 (11)
Diarrhea	1 (14)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (19)	4 (9)
Asthenia	0 (0)	1 (20)	0 (0)	0 (0)	2 (29)	0 (0)	1 (6)	4 (9)
Neutropenia	2 (29)	0 (0)	1 (33)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3 (7)
Febrile neutropenia	0 (0)	1 (20)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (12)	3 (7)

‡Includes MeDRA preferred terms of rash (rash, rash maculo-papular, rash pruritic, rash macular, rash popular, rash erythematous), acne and dermatitis acneiform

‡‡No grade 4 treatment-emergent AEs were reported in $\geq 5\%$ of patients

