

· Cierre la válvula con la ruedita o disco.

El nombre de su antibiótico IV, que debe ser

próxima cita. Utilice otra bolsa que está claro.

mezcla es:

 Apriete la cámara de goteo para iniciar el flujo del antibiótico IV. Llene la cámara de goteo a la mitad.

Cuelgue la bolsa a un nivel más alto que su cabeza.

• Cierre la pinza en el tubo o línea y ponga la punta en el puerto

en de salida de la bolsa intravenosa de antibióticos.

• Abra lentamente la pinza para que el IV antibióticos

llene el tubo o línea. Esto empuja todo el aire del tubo.

para conectar el frasco

Camara

llenado

. Revise usted mismo y asegurarse de que esta ciaro o transparente

Bolsa con la solución Ouita el sello antes de conectar la línea - Inserte la punta de la línea en la entrada de la bolsa

> - Apriete v llene a la mitad la

> > cámara

Cerrar

Recuerde - no deje que la punta del tubo toque nada.

verifique y asegurarse de que está claro o transparente y que no tiene manchas o partículas flotando en él. Si no está claro o transparente, no lo use. Tráigalo a la clínica en su

Después de haberlo mezclado,

Mantenga este antibiótico en el refrigerador? Sí o No

Mezcle cada dosis al momento antes de usarlo.

administration of intravenous fluids, illustrated by the diagram of an intravenous administration set

95S Giving Your IV Antibiotics At Home 12/11 Pág. 2 de 7

(continúa)

Figure S4. An excerpt from the Spanish language translation of the patient training materials explaining