

S2 Table. Statistical significance of the differences in the thickness of the cornified layer between the R26H2BEGFP hairless mice and littermates (See S1C Fig).

	dorsum (L)	dorsum (G)	ear (L)	ear (G)	hind paw (L)	hind paw (G)	interscale (L)	interscale (G)	scale (L)	scale (G)
dorsum (L)	-	n.s.	n.s.	n.s.	**	**	**	**	**	**
dorsum (G)	-	-	n.s.	n.s.	**	**	**	**	**	**
ear (L)	-	-	-	n.s.	**	**	**	**	**	**
ear (G)	-	-	-	-	**	**	**	**	**	**
hind paw (L)	-	-	-	-	-	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.
hind paw (G)	-	-	-	-	-	-	*	n.s.	n.s.	n.s.
interscale (L)	-	-	-	-	-	-	-	n.s.	**	n.s.
interscale (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	*	n.s.
scale (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n.s.
scale (G)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(G) R26H2BEGFP hairless mice (L) littermates ** $P < 0.01$ * $P < 0.05$ n.s. $P \geq 0.05$