| Study name | Time point | Statistics with study removed | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Point | Lower limit | Upper limit | Z-Value | p-Value |
| Campagne 2001 | 2 | 0,158 | 0,107 | 0,232 | -9,360 | 0,000 |
| Delegue 1998 | 4 | 0,144 | 0,097 | 0,213 | -9,666 | 0,000 |
| Devidas 1989 | 10 | 0,157 | 0,106 | 0,232 | -9,308 | 0,000 |
| Doehring 1986 | 12 | 0,171 | 0,120 | 0,242 | -9,912 | 0,000 |
| Kahama 1999 | 12 | 0,144 | 0,097 | 0,215 | -9,568 | 0,000 |
| King 1988 | 12 | 0,143 | 0,096 | 0,213 | -9,576 | 0,000 |
| King 1 2002 | 9 | 0,149 | 0,101 | 0,220 | -9,618 | 0,000 |
| King 2 2002 | 9 | 0,152 | 0,103 | 0,224 | -9,574 | 0,000 |
| Ramarakoto 2008 | 6 | 0,156 | 0,105 | 0,230 | -9,318 | 0,000 |
| Resendramino 1998 | 12 | 0,146 | 0,096 | 0,222 | -9,018 | 0,000 |
| Reimert 2000 | 12 | 0,153 | 0,102 | 0,229 | -9,127 | 0,000 |
| Tohon 2008 | 12 | 0,138 | 0,087 | 0,217 | -8,528 | 0,000 |
| Traore 1998 | 12 | 0,142 | 0,100 | 0,203 | -10,793 | 0,000 |
| Hatz 1 1990 | 6 | 0,182 | 0,129 | 0,257 | -9,727 | 0,000 |
| Hatz 2 1990 | 6 | 0,170 | 0,118 | 0,243 | -9,674 | 0,000 |
| | | 0,154 | 0,106 | 0,223 | -9,850 | 0,000 |




**S12 Fig.** Forest plot showing sensitivity analysis, performed by removing one study at a time, for the effect of treatment on prevalence of ultrasound abnormalities of the urinary bladder.