Dataset	Pendergrass		Milano			Hinchcliff			Bostwick						Christmann		LSSc			UCL		ESO	PBMC			Risbano			
All subjects	SSc N = 22	Control N = 9	SSc N = 24	Control N = 6	Morphea N = 3	SSc N = 34	Control N = 11	Morphea N = 1	SSc N = 14	SSc-PF N = 8	SSc-PAH N = 9	IPF N = 13	IPAH N = 8	Control N = 9	SSc-PF N = 7	Control N = 4	SSc N = 12	SSc-PAH N = 8	SSc-ILD N = 4	SSc N = 10	Control N = 5	SSc N = 16	SSc N = 21	SSc-PAH N = 15	Control N = 10	SSc N = 10	SSc-PAH N = 10	IPAH N = 8	Control N = 10
Age*, mean (SD)	46.1 (9.1)	NA	51.8 (10.4)	40.2 (10.6)	50.7 (2.9)	47.7 (11.7)	41.2 (11.8)	47	49.1 (9.2)	48.1 (7.5)	52.1 (9.1)	NA	NA	NA	44.7 (9.3)	NA	56.5 (12.8)	59 (13.4)	56.5 (17.8)	NA	NA	52.3 (8.7)	49.5 (10.9)	65.4 (6.4)	NA	NA	NA	NA	NA
Sex, n (% women)	17 (77.3)	NA	21 (87.5)	5 (83.3)	3 (100.0)	32 (94.1)	7 (63.6)	1 (100.0)	11 (78.6)	5 (62.5)	5 (55.6)	NA	NA	NA	NA	NA	9 (75.0)	7 (87.5)	4 (100.0)	NA	NA	15 (93.8)	17 (81.0)	12 (80.0)	3 (30.0)	NA	NA	NA	NA
SSc patients only	N = 22		N = 24			N = 34			N = 31						N = 7		N = 24			N = 10		N = 16	N = 36			N = 20			
SSc subtype, n (% diffuse)	22 (100.0)		17 (70.8)			31 (91.2)			14 (45.2)						2 (28.6)		0 (0.0)			0 (0.0)		10 (62.5)	0 (0.0)			NA			
SSc disease duration*, mean (SD)	18.4 (13.1) mos		7.7 (7.2) yrs			52.7 (67.4) mos			NA						74 (76.6) mos		NA			NA		105.0 (105.3) mos	NA			NA			
SSc autoantibody, n (% positive)																													
Scl-70	3 (13.6)		5 (20.8)			9 (26.5)			6 (19.4)						2 (28.6)		NA			NA		6 (37.5)	NA			NA			
RNA Pol III	3 (13.6)		NA			9 (26.5)			2 (6.5)						NA		NA			NA		6 (37.5)	NA			NA			
ACA	1 (4.5)		2 (8.3)			2 (5.9)			6 (19.4)						NA		NA			NA		NA	NA			NA			
SSc intrinsic subset, n (%)																													
Inflammatory	9 (40.9)		5 (20.8)			17 (50.0)			NA						NA		NA			NA		6 (37.5)	NA			NA			
Proliferative	8 (36.4)		11 (45.8)			7 (20.6)			NA						NA		NA			NA		4 (25.0)	NA			NA			
Normal-like	2 (9.1)		4 (16.7)			7 (20.6)			NA						NA		NA			NA		NA	NA			NA			
Limited	NA		3 (12.5)			2 (5.9)			NA						NA		NA			NA		NA	NA			NA			

* At base biopsy