| Study or Subgroup | Rhythm control Mean | SD | Total | Rate control Mean | SD | Total | Weight | Mean Difference IV, Random, 95% CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-CHF 2008 | 35.5 | 9.16 | 682 | 43.5 | 8.99 | 694 | 13.0% | -8.00 [-8.96, -7.04] |
| CAFÉ-II 2009 | 7.5 | 2.8 | 30 | -4.3 | 2.7 | 31 | 12.9% | 11.80 [10.42, 13.18] |
| CAMTAF 2014 | 65.5 | 10.3 | 28 | 49.2 | 11.4 | 27 | 12.2% | 16.30 [10.55, 22.05] |
| Hu 2005 | 71.7 | 27.8 | 92 | 58.5 | 30.5 | 91 | 11.4% | 13.20 [4.74, 21.66] |
| MacDonald 2011 | 3.1 | 9.5 | 22 | -0.77 | 4.4 | 19 | 12.5% | 3.87 [-0.57, 8.31] |
| PIAF 2000 | 39.7 | 10.2 | 127 | 45.7 | 9.4 | 125 | 12.8% | -6.00 [-8.42, -3.58] |
| RACE 2002 | 54.1 | 26 | 266 | 70.4 | 25.1 | 256 | 12.5% | -16.30 [-20.68, -11.92] |
| STAF 2003 | 65.3 | 13.5 | 100 | 60.5 | 16.3 | 100 | 12.6% | 4.80 [0.65, 8.95] |
| **Total (95% CI)** | | | **1347** | | | **1343** | **100.0%** | **2.26 [-5.98, 10.50]** |

Heterogeneity: Tau² = 136.12; Chi² = 652.56, df = 7 (P < 0.00001); I² = 99%

Test for overall effect: Z = 0.54 (P = 0.59)