Study or Subgroup	Rhythm control Mean	SD	Total	Rate control Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
Brignole 1997	59.4	9.9	21	56.5	12	22	11.9%	2.90 [-3.66, 9.46]
CAMTAF 2014	39.8	4.8	28	30.2	5.5	27	16.9%	9.60 [6.87, 12.33]
Fengsrud 2016	59.6	6.5	17	52.9	9	19	13.9%	6.70 [1.61, 11.79]
Jones 2013	32.8	14.3	26	30.2	9.4	26	11.9%	2.60 [-3.98, 9.18]
MacDonald 2011	9.3	11.9	22	0.8	5.9	19	13.1%	8.50 [2.86, 14.14]
PABA-CHF 2008	35	9	41	28	6	40	16.2%	7.00 [3.68, 10.32]
PAF 2 2002	52.5	11	71	54.9	10	70	16.0%	-2.40 [-5.87, 1.07]
Total (95% CI)			**226**			**223**	**100.0%**	**5.08 [1.30, 8.86]**

Heterogeneity: Tau² = 20.04; Chi² = 31.99, df = 6 (P < 0.0001); I² = 81%
Test for overall effect: Z = 2.63 (P = 0.008)