Study or Subgroup	Rhythm control Mean	SD	Total	Rate control Mean	SD	Total	Weight	Mean Difference IV, Random, 95% CI
Brignole 1997	56.6	9.9	21	57.5	12	22	11.7%	-0.90 [-7.46, 5.66]
CAMTAF 2014	38.8	4.8	28	31.8	5.5	27	17.2%	7.00 [4.27, 9.73]
Fengsrud 2016	58	6.5	17	52.9	9	19	13.8%	5.10 [0.01, 10.19]
Jones 2013	32.8	14.3	26	30.2	9.4	26	11.7%	2.60 [-3.98, 9.18]
MacDonald 2011	7.1	11.9	22	2	5.9	19	13.0%	5.10 [-0.54, 10.74]
PABA-CHF 2008	35	9	41	28	6	40	16.4%	7.00 [3.68, 10.32]
PAF 2 2002	51.5	11	71	55.1	10	70	16.2%	-3.60 [-7.07, -0.13]
Total (95% CI)			**226**			**223**	**100.0%**	**3.34 [-0.26, 6.93]**

Heterogeneity: Tau² = 17.60; Chi² = 28.83, df = 6 (P < 0.0001); I² = 79%
Test for overall effect: Z = 1.82 (P = 0.07)