

Table S1. Viable counts following plumbagin (PG) treatment of Msm cells expressing either no gene (empty vector) or *Mtb* thyX (with or without induction).

PG(µg/ml)	CFUs/ml								
	Empty Vector			Uninduced			Induced		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
0	941 x 10 ⁶	600 x 10 ⁶	263 x 10 ⁶	1021 x 10 ⁶	650 x 10 ⁶	363 x 10 ⁶	532 x 10 ⁶	200 x 10 ⁶	186 x 10 ⁶
5	676 x 10 ⁶	700 x 10 ⁶	195 x 10 ⁶	5220 x 10 ⁵	166 x 10 ⁶	242 x 10 ⁶	431 x 10 ⁶	101 x 10 ⁶	120 x 10 ⁶
10	310 x 10 ⁶	223 x 10 ⁶	200 x 10 ⁴	1356 x 10 ⁵	65 x 10 ⁶	<1 x 10 ³	450 x 10 ⁶	98 x 10 ⁶	57 x 10 ⁶
15	<1 x 10 ³	450 x 10 ²	<1 x 10 ³	570 x 10 ²	86 x 10 ³	<1 x 10 ³	94 x 10 ⁶	56 x 10 ⁶	43 x 10 ⁶
20	<1 x 10 ³	560 x 10 ²	<1 x 10 ³	196 x 10 ³	18 x 10 ³	<1 x 10 ³	44 x 10 ⁶	16 x 10 ⁶	34 x 10 ⁶
25	<1 x 10 ³	103 x 10 ³	<1 x 10 ³	1 x 10 ³	<1 x 10 ³	<1 x 10 ³	74 x 10 ⁶	13 x 10 ⁴	11 x 10 ⁶