

SUPPLEMENTARY FIGURES

Functional recovery and serum angiogenin changes according to intensity of rehabilitation therapy after stroke.

Nicolás Garcia-Rodriguez, MD^{1,2}, Susana Rodriguez, MD², Pedro Ignacio Tejada, MD³, Zuberoa Maite Miranda-Artieda, MD³, Natalia Ridaó, MD⁴, Xavi Buxó, MD², María Engracia Pérez-Mesquida, MD², Maria Rosario Beseler, MD⁵, Juan B. Salom, MD^{6,7}, Laura M. Pérez, MD^{8,9}, Marco Inzitari, MD^{8,10}, Sergio Otero-Villaverde, MD¹¹, Rosa Martin-Mourelle, MD¹¹, Mercedes Molleda, MD¹², Manuel Quintana, MSc¹³, Marta Olivé-Gadea, MD¹⁴, Anna Penalba¹, Anna Rosell, PhD¹

¹Neurovascular Research laboratory, Vall d'Hebron Research Institute, Universitat Autònoma de Barcelona. Spain.

²Unidad de Rehabilitación Neurológica y Daño Cerebral, Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, Spain.

³Unidad de Daño Cerebral del Hospital de Górliz. Osakidetza. Spain.

⁴Servei de Medicina Física i Rehabilitació. Parc Taulí Hospital Universitari. Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí I3PT. Sabadell. Spain.

⁵ Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia, Spain.

⁶Unidad Mixta de Investigación Cerebrovascular, Instituto de Investigación Sanitaria La Fe–UV, Valencia, Spain.

⁷Departamento de Fisiología, Universidad de Valencia, Valencia, Spain.

⁸ RE-FiT Barcelona Research Group, Vall d'Hebron Institute of Research and Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona, Spain.

⁹Parc Sanitari Pere Virgili, Area of Intermediate Care, Barcelona, Spain.

¹⁰Universitat Oberta de Catalunya.

¹¹Hospital Marítimo de Oza, A Coruña, Spain.

¹²Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Spain.

¹³Epilepsy Unit and Research Laboratory Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, Spain.

¹⁴Stroke Group. Vall d'Hebron Research Institute, Barcelona, Spain.

Corresponding author: Anna Rosell, PhD. Neurovascular Research Laboratory, Institut de Recerca Hospital Vall d'Hebron. Passeig Vall d'Hebron 119-129, Barcelona, Spain. +34 93489409; anna.rosell@vhir.org

Figure S1. Functional outcome. Box-plots representing the median and IQR temporal profile of the tested scales during follow-up in IRT and NO-IRT cohorts. Differences were assessed with the Wilcoxon test, * $p < 0.05$; ** $p < 0.01$, and *** $p < 0.001$.




Figure S2. Serum Angiogenin. Jitter plots showing the temporal profile of serum angiogenin levels in all strokes regardless the type of rehabilitation therapy. Bars represent mean and 95%CI, and the dashed line shows mean Control levels. Differences were assessed with the Wilcoxon test, *p<0.05.

