Table SIV. Clinical characteristics of samples from The Cancer Genome Atlas.

| Characteristic | | Number |
|---|---|---|
| Status | Alive | 286 |
| | Dead | 218 |
| Age | Mean, years | 61 |
| | Median, years | 61 |
| Sex | Female | 134 |
| | Male | 370 |
| Race | Native American | 2 |
| | Asian | 10 |
| | Black | 47 |
| | White | 430 |
| Tstage | T1 | 34 |
| | T2 | 146 |
| | T3 | 133 |
| | T4 | 25 |
| | T4a | 152 |
| | T4b | 3 |
| | TX | 11 |
| Nstage | N0 | 242 |
| | N1 | 81 |
| | N2 | 19 |
| | N2a | 18 |
| | N2b | 77 |
| | N2c | 41 |
| | N3 | 7 |
| | NX | 19 |
| Mstage | M0 | 479 |
| | M1 | 5 |
| | MX | 20 |
| TNMstage | I | 25 |
| | II | 81 |
| | III | 91 |
| | IVA | 291 |
| | IVB | 13 |
| | IVC | 3 |
| Grade | G1 | 62 |
| | G2 | 301 |

| | G3 | 119 |
|---|---|---|
| | G4 | 2 |
| | GX | 17 |
| Newtumoreventtype | Metastasis | 19 |
| | Primary | 9 |
| | Recurrence | 39 |
| Smoking status | Non-smoking | 113 |
| | Smoking | 381 |
| Radiationtherapy | Non-radiation | 63 |
| | Radiation | 121 |
| Historyofneoadjuvanttreatment | Neoadjuvant | 10 |
| | No neoadjuvant | 494 |
| Therapy | Chemotherapy | 159 |
| | Chemotherapy: Immunotherapy | 3 |
| | Chemotherapy: Other. | 1 |
| | Chemotherapy: Targeted Molecular therapy | 7 |
| | Chemotherapy: Targeted Molecular therapy:Vaccine | 1 |
| | Immunotherapy | 2 |