Study	Events	Total	Proportion	95%−CI	Weight (common)	Weight (random)
Sample size = Small						
García−Salido A	9	45	0.20	[0.11; 0.34]	0.9%	9.7%
Deep A	48	116	0.41	[0.33; 0.51]	3.7%	13.0%
Dhanalakshmi K	3	19	0.16	[0.05; 0.39]	0.3%	6.0%
Shobhavat L	8	21	0.38	[0.20; 0.60]	0.6%	8.5%
Alkan G	5	36	0.14	[0.06; 0.29]	0.6%	8.0%
Gupta Dch S	5	20	0.25	[0.11; 0.48]	0.5%	7.5%
Lima−Setta F	5	56	0.09	[0.04; 0.20]	0.6%	8.2%
Falah NU	1	10	0.10	[0.01; 0.47]	0.1%	2.9%
Lorena Acevedo	23	78	0.29	[0.20; 0.40]	2.1%	12.0%
Fatih Haslak	8	76	0.11	[0.05; 0.20]	0.9%	9.7%
Common effect model		**477**	**0.27**	**[0.23; 0.31]**	**10.4%**	**−−**
Random effects model			**0.21**	**[0.14; 0.30]**	**−−**	**85.4%**
Heterogeneity: I^2 = 76%, τ^2 = 0.4409, p < 0.01						
Sample size = Large						
Allison D Miller	849	4470	0.19	[0.18; 0.20]	89.6%	14.6%
Common effect model		**4947**	**0.20**	**[0.19; 0.21]**	**100.0%**	**−−**
Random effects model			**0.21**	**[0.15; 0.28]**	**−−**	**100.0%**
Heterogeneity: I^2 = 80%, τ^2 = 0.2755, p < 0.01						



Test for subgroup differences (fixed effect): χ^2_1 = 13.93, df = 1 (p < 0.01)

Test for subgroup differences (random effects): χ^2_1 = 0.20, df = 1 (p = 0.66)