| Study or Subgroup | CRPS Mean | CRPS SD | CRPS Total | Control Mean | Control SD | Control Total | Weight | Std. Mean Difference IV, Random, 95% CI | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thimineur 1998 | 11.2 | 5.5 | 140 | 8 | 3.5 | 26 | 6.0% | 0.61 [0.18, 1.03] | 1998 |
| Thimineur 1998 | 8.5 | 5 | 140 | 8 | 3.3 | 26 | 6.0% | 0.10 [-0.31, 0.52] | 1998 |
| Thimineur 1998 | 13.4 | 5.6 | 140 | 11.2 | 5.2 | 26 | 6.0% | 0.40 [-0.03, 0.82] | 1998 |
| Thimineur 1998 | 11.6 | 5.3 | 140 | 10.5 | 3.5 | 26 | 6.0% | 0.22 [-0.20, 0.64] | 1998 |
| Knudsen 2011 | 572 | 45.5 | 17 | 663.9 | 31.5 | 24 | 4.6% | -2.38 [-3.20, -1.56] | 2011 |
| Kolb 2012 | 702 | 797 | 20 | 814.6 | 374.3 | 20 | 5.3% | -0.18 [-0.80, 0.44] | 2012 |
| Rooijen 2013 | 5 | 2.9 | 24 | 7.1 | 2.2 | 42 | 5.7% | -0.84 [-1.36, -0.32] | 2013 |
| Bank 2013 | 353 | 123.5 | 25 | 421.6 | 156.9 | 50 | 5.8% | -0.46 [-0.95, 0.02] | 2013 |
| Rooijen 2013 | 3.9 | 2.15 | 21 | 6.2 | 1.99 | 42 | 5.5% | -1.11 [-1.67, -0.55] | 2013 |
| Rooijen 2013 | 4.7 | 1.87 | 30 | 6.7 | 1.8 | 42 | 5.7% | -1.08 [-1.58, -0.58] | 2013 |
| Rooijen 2013 | 1.47 | 0.76 | 48 | 2.06 | 0.61 | 42 | 6.0% | -0.84 [-1.28, -0.41] | 2013 |
| Terkelsen 2014 | 362 | 126 | 20 | 600 | 270 | 20 | 5.1% | -1.11 [-1.78, -0.44] | 2014 |
| Mainka 2014 | 522.5 | 121.9 | 18 | 483.5 | 101.4 | 18 | 5.2% | 0.34 [-0.32, 1.00] | 2014 |
| Palmer 2019 | 225 | 169 | 36 | 280 | 144 | 37 | 5.9% | -0.35 [-0.81, 0.12] | 2019 |
| Drummond 2021 | 1.77 | 1.48 | 18 | 1.98 | 1.12 | 20 | 5.3% | -0.16 [-0.80, 0.48] | 2021 |
| Drummond 2021 | 2.55 | 0.3 | 12 | 2.1 | 0.89 | 20 | 4.9% | 0.60 [-0.13, 1.33] | 2021 |
| Drummond 2021 | 1.55 | 1.4 | 30 | 2.1 | 1.07 | 20 | 5.5% | -0.42 [-1.00, 0.15] | 2021 |
| Drummond 2021 | 0.87 | 0.55 | 30 | 1.25 | 0.89 | 20 | 5.5% | -0.53 [-1.11, 0.05] | 2021 |
| **Total (95% CI)** | | | **909** | | | **521** | **100.0%** | **-0.38 [-0.69, -0.07]** | |

Heterogeneity: Tau² = 0.37; Chi² = 105.97, df = 17 (P < 0.00001); I² = 84%

Test for overall effect: Z = 2.39 (P = 0.02)