

Zusätzliche Tabelle 2:

Nebenwirkungen/Kontraindikationen/Interaktionen von INH und Rifampicin

	Isoniazid	Rifampicin
Nebenwirkungen	Polyneuritis (in Kombination mit Vitamin B6 Gabe deutlich reduziert), psychische Störungen, Verdauungsstörung, Hepatitis/lebertoxisch, Hautausschlag, Augenrötung	Müdigkeit, Benommenheit, Thrombozytopenie, Flu-like-Syndrom, Magen-Darm-Beschwerden, Hepatitis/lebertoxisch, Hautreaktionen, färbt Körperflüssigkeiten orangerot
Kontraindikationen	Überempfindlichkeit, periphere Neuritis, schwere Blutungsneigung, schwere Lebererkrankung	Überempfindlichkeit, schwere Leberfunktionsstörung, Porphyrie, gleichzeitige Anwendung mit Saquinavir/Ritonavir
Interaktionen	Barbiturate, Phenytoin, Carbamazepin, Primidon, Rifampicin, Valproinsäure, Paracetamol, Ketoconazol, Disulfiram, Alkohol, Antazida, Levodopa	CYP450-Induktor – Vielzahl an Interaktionen, insbesondere Antiepileptika, Benzodiazepine, Paracetamol, Azol-Antimykotika, antivirale Therapien, Antiarrhythmika,...